

ESTABLECE CRITERIOS DE REGIONALIZACION EN RELACION A LAS PLAGAS CUARENTENARIAS PARA EL TERRITORIO DE CHILE

Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA; SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO; DIRECCIÓN NACIONAL

Norma: Resolución 3080 EXENTA

Versión: Última
Versión De: 14/10/2025

Fecha Publicación: 07/11/2003 Fecha Promulgación: 20/10/2003

ESTABLECE CRITERIOS DE REGIONALIZACION EN RELACION A LAS PLAGAS CUARENTENARIAS PARA EL TERRITORIO DE CHILE

Santiago, 20 de octubre de 2003.- Hoy se resolvió lo que sigue:

Núm. 3.080 exenta.- Vistos: Lo dispuesto en la Ley N° 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero de 1989, modificada por la Ley N° 19.283 de 1994; el Decreto Ley N° 3.557 de 1980, sobre Protección Agrícola; el Decreto Ley N° 16 del 5 de Enero de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y

Considerando:

- 1. Que el Acuerdo de Marrakech que estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los Acuerdos Anexos, entre ellos el "Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias", determinan la necesidad de reconocer las condiciones de regionalización derivadas de la presencia, distribución o ausencia de plagas.
- 2. Que Chile como miembro signatario del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias debe asegurar que sus medidas fitosanitarias se adapten a las características fitosanitarias regionales de las zonas de origen y destino de los productos vegetales, ya se trate de todo el país o parte del país.
- 3. Que, para este propósito el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante los correspondientes Análisis de Riesgo de Plagas, está facultado para establecer las Listas de Plagas Cuarentenarias que se consideran cumplen con tal condición y que las mismas constituirán parte de la reglamentación fitosanitaria que deberán cumplir los artículos reglamentados para su ingreso al país.

R e s u e l v o:

Artículo Primero: Para propósitos de esta Resolución, las expresiones técnicas incluidas en ella corresponden a aquellas señaladas en la Norma de Medidas Fitosanitaria N° 5 de Abril de 2002, "Glosario de términos fitosanitarios" de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPTF) de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, y sus actualizaciones.

Artículo primero bis: para los efectos de esta resolución se entenderá por:

- a) Hospedante: Toda especie capaz de sustentar una plaga específica u otro organismo bajo condiciones naturales.
- b) Artículo Reglamentado: Cualquier planta, producto vegetal, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar plagas, que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias.

Resolución
2396 EXENT
A,
AGRICULTURA
N° 2
D.O. 05.05.
2018

Artículo Segundo: Se entenderá por Área a Chile como país incluyendo los territorios insulares, o partes del país que se han definido oficialmente

Artículo Tercero: Declárese a todo el territorio de Chile, tanto continental como insular, país libre de las Plagas Cuarentenarias mencionadas en el Artículo vigésimo, correspondiente a la lista de Plagas Cuarentenarias ausentes en el país, listado que será actualizado periódicamente según la información emanada de las acciones de Vigilancia Fitosanitaria, la evaluación de la información internacional, los registros de intercepción de plagas de los puertos de ingreso y los Análisis de Riesgo de Plagas correspondientes.

Artículo Cuarto: Establécese que las Plagas Cuarentenarias mencionadas en el Artículo vigésimoprimer, el cual será actualizado periódicamente según la información emanada de las acciones de Vigilancia Fitosanitaria, se encuentran presentes, no extendidas en el territorio nacional y sometidas a control oficial de supresión, contención o erradicación.

Artículo Quinto: La condición de las plagas bajo control oficial de erradicación, una vez lograda ésta, implicará la reclasificación de dichas plagas como Plagas Cuarentenarias de la lista del Artículo vigésimo mediante la correspondiente Resolución Exenta de la Dirección Nacional.

Resolución
1162 EXENT
A,
AGRICULTURA
N° 1
D.O. 07.03.
2013

Artículo Sexto: El control oficial de contención de las plagas Thecaphora (Angiosorus) solani, Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2), Globodera rostochiensis, Globodera pallida y Phoma exigua var. foveata genera un área libre de plagas, cuya distribución y reglamentación se establece por las resoluciones específicas en esta materia.

Resolución
2396 EXENT
A,
AGRICULTURA
N° 3
D.O. 05.05.
2018

Resolución
3759 EXENT
A,
AGRICULTURA
N° 2, a),
b)
D.O. 05.06.
2015

Artículo Séptimo: El control oficial de contención de Brevipalpus phoenicis, Dymicoccus brevipes, Pseudococcus elisae, Diabrotica viridula, Sternochetus mangiferae, Aspidiotus destructor, Aceria hibisci, Eutetranychus banksii y Homalodisca vitripennis (= H. coagulata), todas plagas presentes sólo en la Isla de Pascua, genera a Chile continental como área libre de las mismas; y su reglamentación se registrará por las resoluciones específicas en esta materia.

Resolución
1162 EXENT
A,
AGRICULTURA
N° 2
D.O. 07.03.
2013

Artículo Octavo: La detección en el territorio nacional de un brote de Plaga Cuarentenaria listada en el Artículo vigésimo, o la detección de una Plaga Cuarentenaria listada en el Artículo vigésimo primero en un área libre designada oficialmente, no involucrará la pérdida del estatus de país libre o de área libre de plaga, según corresponda, cuando la plaga se encuentre sometida a un control oficial de erradicación, o cuando la plaga se detecte en áreas geográficamente aisladas, sobre las cuales se pueda establecer un control de contención eficiente, mediante la aplicación de los lineamientos del Plan de Emergencia respectivo, acción que deberá generar, para propósitos de auditoría, los registros de información correspondientes.

Artículo Noveno: La presencia de ejemplares aislados de una Plaga Cuarentenaria o capturas simples o aisladas en el caso de plagas de insectos sólo implicará la aplicación de acciones de vigilancia fitosanitaria específicas, intensificadas y sensibilizadas por períodos de acuerdo a la fenología de los cultivos y ciclos esperados de la plaga. En el caso de malezas, ácaros, bacterias, hongos, nematodos virus, viroides, fitoplasmas, moluscos, y capturas múltiples, hembras inseminadas o focos larvarios de insectos, toda detección será considerada brote.

Artículo Décimo: Ante la presencia de un brote de plaga cuarentenaria se delimitarán oficialmente las áreas reglamentadas, las áreas bajo cuarentena, las áreas controladas, las áreas tampón y las áreas en peligro, según corresponda, mediante Resolución publicada en el Diario Oficial, dependiendo de la biología de la plaga y niveles de seguridad cuarentenaria que se requiera alcanzar. Dicha publicación se realiza sin perjuicio de efectuar las correspondientes notificaciones a los tenedores de las propiedades o productos involucrados

Artículo Decimoprimer: Las medidas fitosanitarias que se dispongan en las áreas reglamentadas, las áreas bajo cuarentena, las áreas tampón o las áreas en peligro serán de cargo de los usuarios, productores de cultivos y tenedores de terrenos afectados ubicados dentro de las áreas designadas oficialmente.

Artículo Duodécimo: Entre las medidas fitosanitarias de control oficial de plagas se pueden considerar las siguientes:

- * La destrucción de siembras, plantaciones o cosechas
- * Cuarentena del suelo, involucrando la prohibición de cultivos hospederos de la plaga por un tiempo determinado oficialmente
- * Desinfección de maquinarias y herramientas de cultivo
- * Aplicación de tratamientos cuarentenarios, si éstos están disponibles a los artículos reglamentados afectados,
- * Inmovilización de productos vegetales y otros artículos reglamentados
- * Podas, raleos y otras labores culturales
- * Aplicación de tratamientos físicos, químicos o de control biológico
- * Otros que se determinen

Artículo Decimotercero: Las medidas fitosanitarias establecidas dentro del territorio nacional para el control de Plagas Cuarentenarias deberán ser consistentes con aquellas establecidas para la importación de los mismos productos desde el extranjero. La consideración de las Plagas Cuarentenarias de los Artículos vigésimo y vigésimo primero para la importación de productos involucrarán las medidas fitosanitarias incluidas como declaraciones adicionales, tratamientos cuarentenarios o tratamientos fitosanitarios en las correspondientes

resoluciones de internación, y/o las medidas fitosanitarias adoptadas como consecuencia de la detección de las mismas en un envío importado, en el cual la plaga no fue solicitada como declaración adicional.

Artículo Decimocuarto: Delégase en las Direcciones Regionales correspondientes la designación oficial de las áreas reglamentadas, las áreas bajo cuarentena, las áreas tampón y las áreas controladas y las medidas fitosanitarias a establecer, basadas en los criterios establecidos por el Comité Técnico ad hoc, que administra el Plan de Emergencia en caso de un brote de Plaga Cuarentenaria.

Artículo Decimoquinto: Toda presencia de brote de Plagas Cuarentenarias estará sujeta al proceso de notificación oficial internacional, responsabilidad del Jefe del Departamento de Protección Agrícola en concordancia con la Dirección Nacional del Servicio.

Artículo Decimosexto: Toda detección de Plagas Cuarentenarias en envíos comerciales de artículos importados, incluyendo los embalajes de madera, deberá ser oficialmente notificada al país exportador, incluyendo en dicha notificación las medidas de emergencia adoptadas.

Artículo Decimoséptimo: Se faculta a los inspectores del Servicio, destacados en los puertos de ingreso habilitados, a aplicar las medidas fitosanitarias de emergencia que corresponda ante la detección, en los envíos importados, de plagas cuarentenarias listadas en los Artículos vigésimo y vigésimo primero, o no listadas, las cuales van desde la destrucción de dichos envíos, aplicación de tratamientos cuarentenarios con cargo al importador o la reexportación en el menor tiempo posible, mediante la aplicación del criterio preliminar de ausencia en el territorio nacional. Si la plaga que se detecta no está incluida en alguno de los listados, la misma deberá ser sometida al correspondiente Análisis de Riesgo de Plaga por los especialistas del Servicio, para disponer las medidas fitosanitarias pertinentes y evaluar su inclusión dentro del listado correspondiente.

Artículo Decimoctavo: Se faculta a los inspectores del Servicio, destacados en los puertos de ingreso habilitados, a aplicar las medidas fitosanitarias de emergencia que corresponda ante la detección en los envíos importados, de ejemplares de plagas en estados evolutivos tales que no permitan su total identificación. Dicha medida deberá respaldarse con el correspondiente informe de laboratorio que fundamente la imposibilidad de la identificación.

Artículo Decimonoveno: Todas las personas naturales o jurídicas que detecten plagas cuarentenarias listadas en los Artículos vigésimo y vigésimo primero, o plagas no listadas consideradas ausentes del territorio nacional, están obligadas a declarar su presencia al Servicio, en forma inmediata a su detección, no pudiendo publicar su determinación hasta tanto no se tenga conocimiento y se realice la verificación y determine oficialmente la situación de la plaga en el territorio nacional y se evalúe su factibilidad de control oficial.

Artículo vigésimo: Las plagas señaladas a continuación se encuentran ausentes del territorio nacional, tanto insular como continental y se encuentran relacionadas a los hospedantes que indica:

ÁCAROS

Resolución
7787 EXENT
A,
AGRICULTURA
N° 1 1.1
D.O. 14.10.
2025

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Acalitus</i> (=Phytoptus) <i>phloeocoptes</i>	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus salicina</i> .
<i>Acalitus vaccinii</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Aceria</i> (=Eriophyes) <i>fraxinivorus</i>	<i>Fraxinus</i> spp.
<i>Aceria</i> (=Eriophyes) <i>litchii</i>	<i>Litchi</i> spp.
<i>Aceria diospyri</i>	<i>Diospyros kaki</i> , <i>D. virginiana</i>
<i>Aceria oleae</i>	<i>Olea europaea</i>
<i>Aceria zelkoviana</i>	<i>Zelkova</i> spp.
<i>Aculops tetanothrix</i>	<i>Salix</i> spp.
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	<i>Castanea</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Rosaceae</i> (<i>Prunus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.)
<i>Brevipalpus californicus</i>	<i>Orchidaceae</i> , <i>Allamanda</i> spp., <i>Anthurium</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Croton</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gardenia</i> spp., <i>Geranium</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Pilea</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Vitis</i> spp
<i>Brevipalpus lilium</i>	Polífaga
<i>Brevipalpus russulus</i>	Cactaceae
<i>Bryobia kissophila</i>	<i>Hedera</i> spp.
<i>Bryobia ribis</i>	<i>Ribes</i> spp.
<i>Calacarus citrifolii</i>	<i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp.
<i>Cecidophyopsis vermiformis</i>	<i>Corylus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i>
<i>Eotetranychus carpini</i>	Polífaga de frutales, hortalizas y ornamentales
<i>Eotetranychus populi</i>	<i>Populus</i> spp.
<i>Eotetranychus pruni</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Eotetranychus weldoni</i>	<i>Populus</i> spp.
<i>Eotetranychus willamettei</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Eriophyes amonae</i>	<i>Ammona</i> spp.
<i>Eriophyes armeniaca</i>	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. cerasifera</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. persica</i>
<i>Eriophyes insidiosus</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Eutetranychus orientalis</i>	Polífaga de frutales, ornamentales hortalizas y
<i>Oligonychus castaneae</i>	<i>Castanea crenata</i>
<i>Oligonychus gotohi</i>	<i>Quercus</i> spp.
<i>Oligonychus milleri</i>	<i>Pinus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Oligonychus perseae</i>	<i>Persea</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Oligonychus viridis</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Phytoptus emarginatae</i>	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. domestica</i>
<i>Phytoptus similis</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Schizotetranychus hindustanicus</i>	<i>Citrus</i> spp
<i>Schizotetranychus schizopus</i>	<i>Salix</i> spp.
<i>Steneotarsonemus laticeps</i>	<i>Amaryllis</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Sprekelia formosissima</i>
<i>Temipalpus pacificus</i>	<i>Davalliaceae</i> , <i>Demstaedtiaceae</i> , <i>Dryopteridaceae</i> , <i>Orchidaceae</i> , <i>Polypodiaceae</i> , <i>Pteridaceae</i>
<i>Tetranychus canadensis</i>	<i>Castanea</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Tetranychus kanzawai</i>	Polífaga de frutales, hortalizas y ornamentales
<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	Polífaga de frutales y ornamentales
<i>Tetranychus pacificus</i>	<i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Asplenium</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Tetranychus schoenei</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
<i>Tetranychus mcdanieli</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Tetranychus turkestanii</i>	<i>Rosaceae</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Aralia</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp. <i>Juglans</i> spp., <i>Impatiens</i> spp., <i>Senecio</i> spp. <i>Tagetes</i> spp., <i>Verbena</i> spp., <i>Viola</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Vasates</i> (=Phyllocoptes) <i>aceriscrumena</i> (Sin: <i>Eriophyes acericola</i>)	<i>Acer</i> spp.

INSECTOS COLEÓPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Agrius</i> spp. (excepto <i>A. diaguita</i> , <i>A. sulcipennis</i> , <i>A. thoracicus</i>)	Polífago (<i>Castanea</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Rubus</i> spp. <i>Vitis</i> spp.)
<i>Alcidodes porrectirostris</i> (Sin: <i>Neomecyslobus porrectirostris</i>)	<i>Juglans regia</i>
<i>Amphicerus bimaculatus</i> (= <i>Schistoceros bimaculatus</i>)	<i>Punica granatum</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Anoplophora</i> spp.	<i>Acer</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Quercus</i> spp. <i>Rosa</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Anthonomus eugenii</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>C. frutescens</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i>
<i>Anthonomus musculus</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Anthonomus pedicularis</i>	<i>Prunus domestica</i> , <i>Pyrus</i> spp.
<i>Anthonomus piri</i>	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Anthonomus pomorum</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp.
<i>Anthonomus rubi</i>	<i>Fragaria</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Anthonomus signatus</i>	<i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Apion pisi</i>	<i>Vicia</i> spp.
<i>Aromia bungii</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Brachycerus</i> spp.	<i>Allium</i> spp., <i>Arum</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Tulipa</i> spp., <i>Zantedeschia</i> spp.
<i>Bruchidius</i> spp. (excepto <i>B. endotubercularis</i>)	<i>Arachis hypogea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Lens culinaris</i> , <i>Lotus</i> spp., <i>Lupinus mutabilis</i> , <i>Lupinus albus</i> , <i>L. angustifolius</i> , <i>L. parvijlorus</i> , <i>Lupinus luteus</i> , <i>Medicago</i> spp., <i>Phaseolus lunatus</i> , <i>P. vulgaris</i> , <i>P. coccineus</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Trifolium</i> spp., <i>Vicia faba</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Bruchus</i> spp. (excepto <i>B. pisorum</i> y <i>B. rufimanus</i>)	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Lathyrus odoratus</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Lens culinaris</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vicia</i> spp.
<i>Byturus rubi</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Byturus tomentosus</i>	<i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp. e híbridos (frutos)
<i>Byturus unicolor</i>	<i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp. e híbridos (frutos)
<i>Callosobruchus</i> spp.	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Lablab purpureus</i> , <i>Lens culinaris</i> , <i>Lupinus mutabilis</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum</i> spp., <i>Sesamum indicum</i> , <i>Vicia</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
<i>Capnodis tenebrionis</i>	<i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Caryedon serratus</i>	Fabaceae
<i>Caulophilus oryzae</i>	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Panicum miliaceum</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Zingiber officinale</i>
<i>Chrysobothris</i> spp. (excepto <i>Chrysobothris bothrideres</i>)	Polífago, <i>Acer</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
<i>Conotrachelus aguacatae</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Conotrachelus carinifer</i>	<i>Castanea</i> spp.
<i>Conotrachelus juglandis</i>	<i>Juglans</i> spp. (Frutos secos)
<i>Conotrachelus nemophar</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp. <i>Pyrus</i> spp.,
<i>Conotrachelus perseae</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Conotrachelus retentus</i>	<i>Carya</i> spp., <i>Juglans</i> spp.
<i>Copturus aguacatae</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Coraebus elatus</i>	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Crioceris asparagi</i>	<i>Asparagus officinalis</i>
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Curculio caryae</i>	<i>Carya</i> spp.
<i>Curculio caryatrypes</i>	<i>Castanea</i> spp.
<i>Curculio elephas</i>	<i>Castanea</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Curculio nucum</i>	<i>Corylus</i> spp.
<i>Curculio occidentalis</i>	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Castanea</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Quercus</i> spp. (Frutos secos)
<i>Curculio sayi</i>	<i>Castanea</i> spp.
<i>Cylindrocopturus</i> spp.	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Dendroctonus</i> spp.	Coniferales
<i>Diabrotica</i> spp. (excepto <i>D. viridula</i>)	<i>Cucumis melo</i> , <i>Jatropha curcas</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Polífago; <i>Citrus</i> spp., <i>Cordyline fruticosa</i> , <i>Dracaena</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Nephelium lappaceum</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Epicaerus cognatus</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Epilachma</i> spp.	Cucurbitaceae, <i>Duboisia leichhardtii</i> , <i>Duboisia myoporoides</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> .
<i>Epirix</i> spp. (excepto <i>E. fasciata</i>)	<i>Armoracia rusticana</i> , <i>Solanum tuberosum</i> y otras Solanaceae.
<i>Euscepes postfasciatus</i>	<i>Ipomoea batatas</i> , <i>Manihot esculenta</i> .
<i>Eurwallacea formicatus sensu lato</i>	Latifoliadas y frutales.
<i>Furcipes rectirostris</i> (Sin: <i>Anthonomus rectirostris</i>)	<i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasus</i> .
<i>Gonipterus gibberus</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Heilipus lauri</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Heilipus trifasciatus</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Heterobostrychus aequalis</i>	Latifoliadas (madera y embalajes)
<i>Hylobius</i> spp.	Coniferales (plantas, madera y embalajes)
<i>Hylurgops palliatus</i>	<i>Picea</i> spp., embalajes) <i>Pinus</i> spp. (madera y

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Ips</i> spp.	Coniferales
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	<i>Petunia</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	Alismataceae, Araceae, Cyperaceae, Poaceae, Typhaceae, <i>Oryza sativa</i> , <i>Vetiveria zizanoides</i>
<i>Listronotus dauci</i>	<i>Daucus carota</i>
<i>Listronotus oregonensis</i>	<i>Anethum graveolens</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
<i>Listronotus texanus</i>	<i>Anethum graveolens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
<i>Lobiopa insularis</i>	Polífaga de frutos
<i>Megaplatypus mutatus</i> (= <i>Platypus mutatus</i>)	<i>Aspidiosperma</i> spp., <i>Astronium</i> spp., <i>Astronium urundeiva</i> , <i>Chlorophoro tinctoria</i> <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Parapitadenia</i> (= <i>Piptadenia</i>) <i>rigida</i> , <i>Patagonula americana</i> , <i>Peltophorium dubium</i> , <i>Piptadenia macrocarpa</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Schinopsis balansae</i> , <i>Schinopsis brasiliensis</i> , <i>Tabebuia impetiginosa</i> , <i>Taralea oppositifolia</i>
<i>Metamasius spinolae</i>	<i>Opuntia</i> spp., <i>Hylocereus costaricensis</i> y <i>Hylocereus undatus</i>
<i>Moneilema</i> spp.	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Monochamus</i> spp.	Coniferales (madera y embalajes)
<i>Neochlamisus cribripennis</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Oberea bimaculata</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Oberea linearis</i>	Polífaga de frutales y forestales
<i>Oberea myops</i>	<i>Rhododendron</i> spp.
<i>Oemona hirta</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Oncideres</i> spp.	<i>Carya</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Populus</i> spp.
<i>Oryctes rhinoceros</i>	<i>Cocos</i> spp.
<i>Otiorynchus cribricollis</i>	Polífaga de frutales; <i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Otiorynchus singularis</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Humulus lupulus</i> , <i>Hydrangea</i> spp., <i>Larix kaempferi</i> , <i>Metasequoia glyptostroboides</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Pinopsida</i> spp., <i>Primula</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Taxus baccata</i> , <i>Thuja heterophylla</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Tsuga plicata</i> , <i>Viburnum</i> spp., <i>Winteria</i> spp.
<i>Oxystoma cracca</i>	<i>Vicia</i> spp.
<i>Pachymeris</i> spp.	Arecaceae, <i>Acacia</i> spp., <i>Cassia fistula</i> , <i>Cocos</i> spp., <i>Tamarindus indica</i>
<i>Paropsisterna bimaculata</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Paropsisterna m-fuscum</i>	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Corymbia</i> spp.
<i>Phaenops californica</i> (= <i>Melanophila californica</i>)	<i>Pinus</i> spp. (madera y embalajes)
<i>Phlyctinus callosus</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Phyrdemus muriceus</i>	<i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp.
<i>Pissodes</i> spp. (excepto <i>P. castaneus</i>)	Coniferales
<i>Pityophthorus juglandis</i>	<i>Juglans</i> spp., <i>Pterocarya</i> spp.
<i>Plagiodes versicolora</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Popillia japonica</i>	Polífaga de frutales y ornamentales
<i>Prennotrypes</i> spp. (excepto <i>P. latithorax</i>)	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Prionus</i> spp.	<i>Castanea</i> spp., <i>Malus</i> spp.
<i>Prostephanus truncatus</i>	<i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> (granos y semillas)
<i>Pseudopityophthorus</i> spp.	<i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Rhigopsidius piercei</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Rhynchites</i> spp.	<i>Fragaria</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Rhynchophorus</i> spp.	<i>Areca</i> spp., <i>Arenga</i> spp., <i>Archontophoenix</i> spp., <i>Attalea</i> spp., <i>Bactris</i> spp., <i>Bismarckia nobilis</i> , <i>Brahea armata</i> , <i>Butia</i> spp., <i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chambeyronia macrocarpa</i> , <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Livistona australis</i> , <i>Livistona chinensis</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Washingtonia</i> spp. y <i>Wodyetia bifurcata</i>
<i>Saperda carcharias</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp. (madera)
<i>Saperda populnea</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Saperda scalaris</i>	Polifago de frutales
<i>Scolytus amygdali</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
<i>Scolytus intricatus</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Morus</i> spp., <i>Ostrya</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sorbus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
<i>Scolytus scolytus</i>	<i>Ulmus</i> spp.
<i>Sinoxylon</i> spp.	<i>Acacia</i> spp. (madera y embalajes), <i>Bambusa</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Sternochetus frigidus</i>	<i>Mangifera indica</i>
<i>Stromatium fulvum</i>	Latifoliadas y coniferales (madera y embalajes)
<i>Tomicus</i> (= <i>Blastophagus</i>) <i>piniperda</i>	<i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Trachymela tincticollis</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Tribolium madens</i>	Polifaga granos y productos almacenados
<i>Trichoferus</i> spp.	Polifaga maderas y embalajes
<i>Trogoderma granarium</i>	Polifago de granos, semillas y productos almacenados
<i>Trogoderma inclusum</i>	Polifago de granos, semillas y productos almacenados
<i>Tylocladia fragariae</i>	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Vesperus xatarti</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Xyleborus dispar</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. persica</i> , <i>P. persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>P. salicina</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Vitis</i> spp., Maderas de embalaje
<i>Xyleborus ferrugineus</i>	<i>Araucaria angustifolia</i> , <i>Cordyline</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Xyleborus glabratus</i>	<i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Leucaena glauca</i> , <i>Lindera</i> spp., <i>Lithocarpus edulis</i> , <i>Litsea</i> spp., <i>Persea</i> spp., <i>Phoebe lanceolata</i> , <i>Sassafras albidum</i> , <i>Shorea robusta</i>
<i>Xylopsocus gibbicollis</i>	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Xylosandrus compactus</i>	Polifaga de ornamentales, frutales y forestales
<i>Xylosandrus crassiusculus</i>	<i>Bambusa</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Lagerstroemia indica</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Piper methysticum</i> , <i>Prunus</i> spp.
<i>Xylosandrus germanus</i>	Polifaga: frutales, forestales, ornamentales y madera de embalaje
<i>Xylotrechus arvicola</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Xylotrechus namanganensis</i>	<i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Celtis australis</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Eleagnus angustifolia</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Morus nigra</i> , <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus</i> spp. (madera).
<i>Zabrotes subfasciatus</i>	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Cassia fistula</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Lablab purpureus</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Lens culinaris</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum</i> spp., <i>Vicia</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Anastrepha</i> spp.	Polífaga de frutos
<i>Apiomyia bergenstammii</i>	<i>Crataegus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Asphondylia opuntiae</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Asphondylia prunorum</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Bactrocera</i> spp.	Polífaga de frutos
<i>Ceratitis</i> spp.	Polífaga de frutos
<i>Chromatomyia</i> (= <i>Phytomyza</i>) <i>horticola</i>	<i>Ageratum houstonianum</i> , <i>Antirrhinum</i> spp., <i>Armoracia rusticana</i> , <i>Campanula</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Gypsophila elegans</i> , <i>G. paniculata</i> , <i>Lavandula</i> spp., <i>Petunia</i> spp., <i>Phlox</i> spp., <i>Verbena</i> spp.
<i>Contarinia pruniflorum</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i>
<i>Contarinia tritici</i>	<i>Triticum</i> spp.
<i>Dacus</i> spp.	Polífaga de frutos
<i>Dasineura fraxini</i>	<i>Fraxinus</i> spp.
<i>Dasineura mali</i>	<i>Malus</i> spp.
<i>Dasineura oleae</i>	<i>Olea europaea</i>
<i>Dasineura oxycoccana</i> (= <i>D. vaccinii</i>)	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Dasineura pyri</i>	<i>Pyrus communis</i>
<i>Dastops bennetti</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Eumerus tuberculatus</i>	<i>Amaryllis</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Tulipa</i> spp.
<i>Helicomyia</i> (= <i>Rabdophaga</i>) <i>saliciperda</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Hydrellia griseola</i>	<i>Poaceae</i> , <i>Allium</i> spp., <i>Vetiveria zizanioides</i>
<i>Liriomyza trifolii</i>	Polífaga de ornamentales, <i>Cucurbitaceae</i>
<i>Mayetiola destructor</i>	<i>Triticum</i> spp.
<i>Merodon</i> spp.	<i>Amaryllis</i> spp., <i>Galanthus</i> spp., <i>Galtonia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Muscari</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Nerine</i> spp., <i>Ornithogalum</i> spp., <i>Scilla</i> spp., <i>Tulipa</i> spp.
<i>Neosilba batesi</i>	<i>Annona</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Solanum quitoense</i>
<i>Pegomya rubivora</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Phytomyza gymnostoma</i>	<i>Allium</i> spp.
<i>Prodiplosis longifila</i>	<i>Asparagus officinalis</i>
<i>Prodiplosis vaccinii</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Psila rosae</i>	<i>Apium graveolens</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Daucus carota</i> ,
<i>Resseliella citrifrugis</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Resseliella theobaldi</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Rhagoletis</i> spp. (excepto especies presentes en Chile)	<i>Juglans regia</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Toxotrypana curvicauda</i>	<i>Caricaceae</i>
<i>Trypeta zoe</i>	<i>Artemisia</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp.

HEMÍPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	<i>Annona</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>P. pyrifolia</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Aleurocanthus woglumi</i>	<i>Begonia</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Ixora</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Troyer citrange</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Aleurodicus</i> spp. (excepto <i>A. juleikae</i>)	Polífaga ornamentales y frutales: <i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Bismarckia nobilis</i> , <i>Bougainvillea</i> spp., <i>Brahea armata</i> , <i>Brassavola</i> spp., <i>Caryota</i> spp., <i>Cassia fistula</i> , <i>Cattleya</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chambeyronia macrocarpa</i> , <i>Cocos</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Dypsis</i> (= <i>Chrysalidocarpus</i>) <i>lutescens</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Hedera</i> spp., <i>Hibiscus rosasinensis</i> , <i>Jasminum</i> spp., <i>Jatropha curcas</i> , <i>Livistona australis</i> , <i>L. chinensis</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Photinia</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Prunus serrulata</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Strelitzia reginae</i> , <i>Wodyetia bifurcata</i>
<i>Aleyrodes lonicerae</i>	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Amphorophora</i> (= <i>Aphis</i>) <i>rubi</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Amphorophora agathonica</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Aonidiella orientalis</i>	<i>Arecaceae</i> , <i>Orchidaceae</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Cassia fistula</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Croton</i> spp., <i>Cycas</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Ziziphus jujuba</i>
<i>Aphanostigma iaksuense</i> (Kishida)	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Aphanostigma piri</i>	<i>Pyrus communis</i>
<i>Aphis pomi</i>	<i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Pyrus</i> spp.
<i>Aphis schneideri</i>	<i>Ribes</i> spp.
<i>Aphis vaccinii</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Asymmetrasca</i> (= <i>Empoasca</i>) <i>decedens</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Bactericera cockerelli</i>	<i>Solanaceae</i>
<i>Bemisia tabaci</i> (excepto <i>Bemisia tabaci</i> biotipo b)	Polífaga de ornamentales, <i>Carica papaya</i> , <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mentha piperita</i> , <i>Nicotiana tabacum</i>
<i>Brachycaudus cardui</i>	<i>Asteraceae</i> , <i>Boraginaceae</i> y <i>Rosaceae</i>
<i>Cacopsylla melanoneura</i>	<i>Crataegus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Cacopsylla picta</i>	<i>Malus</i> spp.
<i>Cacopsylla pruni</i>	<i>Prunus persica</i>
<i>Cacopsylla pyri</i>	<i>Pyrus communis</i>
<i>Cacopsylla pyricola</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Cerataphis orchidearum</i>	<i>Orchidaceae</i>
<i>Ceroplastes destructor</i>	Polífaga de frutales y ornamentales
<i>Ceroplastes floridensis</i>	Polífaga de frutales y ornamentales: <i>Acca sellowiana</i> (= <i>Feijoa</i>), <i>Alpinia</i> spp., <i>Asplenium</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Cordyline</i> spp., <i>Cycas</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Euonymus japonicus</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Heliconia</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Lagerstroemia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Myrsine africana</i> , <i>Myrtus communis</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Philodendron</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Pittosporum</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Prunus salicina</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Vaccinium</i> spp., <i>Zingiber</i> spp.
<i>Ceroplastes japonicus</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., y ornamentales: <i>Acer</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Cycas</i> spp., <i>Hedera</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Laurus nobilis</i> , <i>Magnolia grandiflora</i> , <i>Myrsine africana</i> , <i>Platanus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus minor</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Ceroplastes rubens</i>	Polífaga: <i>Aglaonema</i> spp., <i>Alpinia purpurata</i> , <i>Anthurium</i> spp., <i>Asplenium</i> spp., <i>Cibotium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Curculigo</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Photinia</i> spp., <i>Polypodium punctatum</i> , <i>Pyrus</i> spp.
<i>Ceroplastes rusci</i>	<i>Actinidia</i> spp., <i>Chamaerops humilis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Chelinidea tabulata</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Chionaspis pinifoliae</i>	Coniferales
<i>Chionaspis salicis</i>	Polífaga de forestales y ornamentales, <i>Corylus avellana</i>
<i>Coccus pseudomagnoliarum</i>	Rutaceae: <i>Citrus</i> spp. e híbridos, <i>Evodia rutaecarpa</i> , <i>Poncirus trifoliata</i>
<i>Colladonus</i> spp.	<i>Prunus</i> spp.
<i>Cryptomyzus galeopsidis</i>	<i>Ribes</i> spp.
<i>Ctenarytaina spatulata</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Dactylopius</i> spp. (excepto <i>D. coccus</i>)	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Diaphorina citri</i>	Rutaceae: <i>Atalantia missionis</i> , <i>Citrus</i> spp. e híbridos, <i>Fortunella</i> spp., <i>Murraya</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Swinglea glutinosa</i>
<i>Diaspidiotus juglansregiae</i> (Comstock)	<i>Juglans hindsii</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> y polífaga ornamentales y forestales.
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i> (= <i>Quadraspidotus ostreaeformis</i>)	Rosaceae, <i>Acer</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Malus</i> spp. <i>Phoenix</i> spp., <i>Platanus orientalis</i> , <i>Rhododendron</i> spp.
<i>Draeculacephala minerva</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Dysaphis plantaginea</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Dysaphis pyri</i>	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Dysmicoccus neobrevipes</i>	Polífaga
<i>Dysmicoccus vaccinii</i>	<i>Vaccinium ashei</i> , <i>V. corymbosum</i>
<i>Empoasca nipponica</i> Dworakowska	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Ericaphis fimbriata</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Eriosoma grossulariae</i>	<i>Ribes</i> spp.
<i>Erthesina fullo</i>	Polífaga y otros artículos reglamentados, como naves y contenedores marítimos.
<i>Erythroneura</i> spp.	<i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Eucalyptolyma maideni</i>	<i>Corymbia citriodora</i> , <i>C. gummifera</i> y <i>C. maculata</i>
<i>Euschistus conspersus</i>	Polífaga de frutales, cultivos y otros artículos reglamentados
<i>Ferrisia gilli</i>	<i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Ferrisia malvastra</i>	Polífaga de frutales, hortalizas y ornamentales
<i>Ferrisia virgata</i>	Polífaga de frutales y ornamentales; <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Curcubita maxima</i> , <i>Curcubita pepo</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Jatropha curcas</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Piper</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Theobroma cacao</i>
<i>Fiebertiella florii</i>	Rosaceae
<i>Geisha distinctissima</i> (Walker)	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Hesperolabops gelastops</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Howardia biclavis</i>	<i>Allamanda</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gardenia</i> spp., <i>Ixora</i> spp., <i>Litchi chinensis</i> , <i>Photinia</i> spp., <i>Piper methysticum</i>
<i>Icerya aegyptiaca</i>	<i>Annona</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Croton</i> spp. <i>Cycas</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Mangifera</i> spp., <i>Morus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Plumbago capensis</i> , <i>Punica granatum</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Insignorthesia</i> (= <i>Orthezia</i>) <i>insignis</i>	<i>Acanthus mollis</i> , <i>Ageratum houstonianum</i> , <i>Aster</i> spp., <i>Begonia</i> spp., <i>Bougainvillea</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Chrysanthemum frutescens</i> , <i>Codiaeum</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Croton</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Gardenia</i> spp., <i>Geranium</i> spp., <i>Hypericum</i> spp., <i>Ixora</i> spp., <i>Petunia</i> spp., <i>Pilea</i> spp., <i>Salvia</i> spp., <i>Strelitzia</i> spp., <i>Verbena</i> spp., <i>Viola</i> spp.
<i>Lepidosaphes gloverii</i>	<i>Alocasia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Croton</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
<i>Lepidosaphes ussuriensis</i>	<i>Alnus hirsuta</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Euonymus maackii</i> , <i>Malus baccata</i> , <i>Malus mandschurica</i> , <i>Physocarpus amurensis</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Syringa amurensis</i> , <i>Ulmus</i> spp.
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	<i>Camellia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Magnolia grandiflora</i> , <i>Paeonia</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Lycorma delicatula</i>	Polífaga de frutales, forestales y ornamentales
<i>Lygocoris pabulinus</i>	<i>Salvia</i> spp.
<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Polífaga: <i>Acacia</i> spp., <i>Allamanda</i> spp., <i>Alocasia</i> spp., <i>Alpinia purpurata</i> , <i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Ammonia</i> spp., <i>Anthurium</i> spp., <i>Aralia</i> spp., <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Begonia</i> spp., <i>Bougainvillea</i> spp., <i>Cassia fistula</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Croton</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Dracaena</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gerbera</i> spp., <i>Grevillea</i> spp., <i>Heliconia</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Ixora</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Kalanchoe</i> spp., <i>Lantana camara</i> , <i>Malpighia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Myrtus</i> spp., <i>Nerium oleander</i> , <i>Opuntia</i> spp., <i>Parkinsonia</i> spp., <i>Passiflora edulis</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Rhododendron</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Margarodes prieskaensis</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Margarodes vrendendalensis</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Megacopta cribraria</i>	Naves, contenedores y otros artículos reglamentados
<i>Melanaspis paulistae</i> McKenzie	<i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
<i>Mercetaspis halli</i>	Rosaceae
<i>Mesolecanium nigrofasciatum</i>	Polífaga frutales y ornamentales
<i>Metcalfe pruinosus</i>	Polífaga: <i>Actinidia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis</i> spp.
<i>Myzus cerasi</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Neolithurus</i> (= <i>Circulifer</i>) <i>haematocephalus</i>	Polífaga de hortalizas, cultivos, hortalizas y ornamentales.
<i>Neolithurus</i> (= <i>Circulifer</i>) <i>tenellus</i>	Polífaga de hortalizas, cultivos, hortalizas y ornamentales.
<i>Neopulvinaria innumerabilis</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Nipaecoccus nipae</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Vitis</i> spp., y ornamentales: <i>Arecaceae</i> , <i>Orchidaceae</i> , <i>Anthurium</i> spp., <i>Carludovica palmata</i> , <i>Curculigo</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Pandanus</i> spp., <i>Philodendron</i> spp., <i>Tillandsia</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Ziziphus jujuba</i>
<i>Nipaecoccus viridis</i>	<i>Asparagus virgatus</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Oncometopia nigricans</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Paracoccus burnerae</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Gleditsia</i> spp., <i>Hibiscus rosasinensis</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>Viburnum</i> spp.
<i>Paraphlepsius irroratus</i>	<i>Prunus</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Parlatoria</i> spp. (excepto <i>P. camelliae</i> , <i>P. oleae</i> y <i>P. pittospori</i>)	Polífaga de ornamentales y frutales
<i>Parthenolecanium prunosum</i>	<i>Juglans</i> spp., <i>Pistacia vera</i>
<i>Penthimiola bella</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i>
<i>Phenacoccus aceris</i>	Polífaga de árboles y arbustos: <i>Rosaceae</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus mahaleb</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersic</i> , <i>Prunus salicina</i> <i>Ribes</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Phenacoccus avenae</i>	<i>Crocus</i> spp., <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Scilla</i> spp., <i>Tulipa</i> spp.
<i>Phenacoccus madeirensis</i>	Polífaga de ornamentales
<i>Philaenus spumarius</i>	<i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Planococcus ficus</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Planococcus kraunhiae</i>	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Planococcus minor</i>	<i>Adenium obesum</i> , <i>Nephelium</i> spp., <i>Sechium</i> spp., y <i>Garcinia</i> spp.
<i>Pochazia shantungensis</i>	Polífaga de frutales, forestales y ornamentales.
<i>Pollinia pollini</i>	<i>Olea europaea</i>
<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i>	<i>Taxus</i> spp., ornamentales
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	<i>Rosaceae</i> , <i>Actinidia arguta</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Clematis</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Salix</i> spp., <i>Vitis</i> spp. y varios ornamentales
<i>Pseudaulacaspis prunicola</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Pseudococcus comstocki</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Cissus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Fortunella</i> spp., <i>Gardenia</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Pandanus</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Prunus serrulata</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Rhododendron</i> spp., <i>Troyer citrange</i>
<i>Pseudococcus cryptus</i> (= <i>P. citriculus</i>)	<i>Citrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Pandanus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Selaginella lepidophylla</i>
<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>	Polífaga ornamentales, <i>Annona</i> spp., <i>Cucumis melo</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Hylocereus undatus</i> , <i>Jatropha curcas</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Nephelium lappaceum</i> , <i>Sechium edule</i> , <i>Solanum</i> spp.
<i>Pseudococcus maritimus</i>	<i>Actinidia arguta</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Pistacea</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Zantedeschia</i> spp.
<i>Pulvinaria vitis</i>	<i>Rosaceae</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai & Takagi (Sin. <i>Ripersiella hibisci</i> (Kawai & Takagi))	Polífaga de ornamentales
<i>Rhopalosiphum insertum</i>	<i>Rosaceae</i> y <i>Poaceae</i>
<i>Scaphoideus titanus</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Scaphytopius</i> spp. (excepto <i>S. sulphureus</i>)	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Schizaphis piricola</i>	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Scolypopa australis</i>	<i>Actinidia</i> spp., <i>Passiflora edulis</i> , <i>Rubus fruticosus</i> ; especies ornamentales

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Selenaspis articulatus</i>	Polífaga de frutales y ornamentales
<i>Sphaerolecanium prunastri</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Stephanitis rhododendri</i>	<i>Rhododendron</i> spp.
<i>Targionia vitis</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Tetraneura mori</i>	<i>Ageratum houstonianum</i> , <i>Arctotis</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Coreopsis</i> spp., <i>Gaillardia</i> spp., <i>Gazania</i> spp., <i>Gerbera</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Osteospermum</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rudbeckia</i> spp., <i>Sanvitalia procumbens</i> , <i>Solidaster</i> spp., <i>Tagetes</i> spp.
<i>Trioxa erythrae</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Trioxa perseae</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Trioxa tripunctata</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Unaspis yanonensis</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Viteus</i> (= <i>Daktulosphaira</i>) <i>vitifoliae</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Vryburgia amaryllidis</i>	<i>Agapanthus</i> spp., <i>Aloe</i> spp., <i>Amaryllis</i> spp., <i>Cilantro</i> spp., <i>Crassulaceae</i> (<i>Crassula</i> , <i>Echeveria</i>), <i>Criminum flaccidum</i> , <i>Criminum x powellii</i> , <i>Haemanthus</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Nerine undulata</i> , <i>Ornithogalum</i> spp., <i>Scilla</i> spp., <i>Sprekelia</i> spp., <i>Zephyranthes</i> spp.

HYMENÓPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Athalia rosae</i>	Brassicaceae, <i>Armoracia rusticana</i> , <i>Beta vulgaris</i>
<i>Bephratelloides</i> spp.	<i>Ammonia</i> spp.
<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	<i>Castanea</i> spp.
<i>Eurytoma</i> spp.	Orchidaceae, spp.(semillas) <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus</i>
<i>Euura atra</i>	<i>Salix</i> spp.
<i>Hemadas nubilipennis</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Hoplocampa</i> spp.	Rosaceae
<i>Janus abbreviatus</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Janus compressus</i>	<i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Megastigmus</i> spp. (excepto <i>M. transvaalensis</i> y especies parasitoides)	Coniferales, <i>Pistacia</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Neodiprion</i> spp.	<i>Abies</i> spp., <i>Cedrus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Ophelimus eucalypti</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Ophelimus maskelli</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Prodecatoma cooki</i>	<i>Vitis</i> spp. (semillas)
<i>Selitrichodes globulus</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Sirex cyaneus</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Sirex ermak</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp. (madera y embalaje)

LEPIDÓPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Acleris</i> spp.	Polífaga
<i>Acrobasis</i> (=Numonia) <i>pyrivorella</i>	<i>Pyrus</i> spp.
<i>Acrobasis mixvorella</i>	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans regia</i>
<i>Acrobasis vaccini</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Acrobypia pleurodella</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Acrolepiopsis assectella</i>	<i>Allium</i> spp.
<i>Adoxophyes cyrtosema</i>	<i>Camellia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Dimocarpus longan</i> (=Euphoria longana), <i>Litchi chinensis</i> , <i>Rosa multiflora</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Adoxophyes orana</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Actinidia arguta</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
<i>Aglaope infausta</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
<i>Agrotis segetum</i>	<i>Allium</i> spp., <i>Freesia refracta</i> , <i>Gladiolus</i> spp. y <i>Paeonia officinalis</i>
<i>Amblyptilia pica</i>	<i>Antirrhinum</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
<i>Anyelois (=Paramyelois) transitella</i>	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus dulcis</i> (fruta seca)
<i>Anarsia lineatella</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Archips</i> spp.	Polífaga de frutales y forestales, <i>Abies</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Lonicera</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Argyresthia cupressella</i>	<i>Chamaecyparis</i> spp., <i>Cupressus</i> spp., <i>Sequoia sempervirens</i>
<i>Argyresthia pruniella</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Argyrotaenia franciscana</i> (=A. citrana)	<i>Acacia</i> spp., <i>Begonia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Dianthus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Geranium</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Pittosporum</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Argyrotaenia ljunghiana</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Argyrotaenia sphaeropa</i>	Polífaga de frutales, vid y otros
<i>Azochis griposalis</i>	<i>Ficus carica</i>
<i>Bonagota salubricola</i> (=B. cranaodes)	Polífaga de frutales y ornamentales
<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Dianthus</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Fuchsia</i> spp., <i>Geranium</i> spp., <i>Laurus nobilis</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rosmarinus</i> spp.
<i>Calliteara (=Elkneria) pudibunda</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Salix</i> spp., ornamentales
<i>Caloptilia azaleella</i>	<i>Rhododendron</i> spp.
<i>Carposina rubophaga</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Carposina sasakii</i> (=C. niponensis)	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Ziziphus jujuba</i>
<i>Choristoneura occidentalis</i>	Coniferales
<i>Choristoneura rosaceana</i>	Polífaga: Coniferales, <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Ilex</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pistacia vera</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Citripestis sagittiferella</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Cnephasia jactatana</i>	<i>Actinidia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Fuchsia</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Cnephasia longana</i>	<i>Aster</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Conogethes punctiferalis</i>	Polífaga: <i>Citrus</i> spp., <i>Macadamia</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Corcyra cephalonica</i>	Polífaga de granos y productos almacenados
<i>Coryphodema tristis</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Cossus cossus</i>	Polífaga de forestales, frutales y ornamentales
<i>Cryptoblabes gnidiella</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Macadamia</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Cryptophlebia illepidia</i>	<i>Cassia fistula</i> , <i>Litchi</i> spp., <i>Macadamia</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>	<i>Dimocarpus longan</i> (= <i>Euphoria longana</i>), <i>Litchi</i> spp.
<i>Ctenopseustis herana</i>	<i>Actinidia</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Ctenopseustis obliquana</i>	<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>R. idaeus</i> , <i>Vaccinium</i> spp., pomáceas
<i>Cydia</i> spp. (excepto <i>C. pomonella</i> , <i>C. largo</i> y <i>C. tonosticha</i>)	Rosaceae, <i>Acer</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Dendrolimus spectabilis</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Cedrus</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Dendrolimus superans</i> (= <i>D. sibiricus</i>)	<i>Abies</i> spp., <i>Cedrus</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Tsuga</i> spp.
<i>Deudorix isocrates</i>	<i>Punica granatum</i> , <i>Citrus</i> spp.
<i>Diaphania hyalinata</i>	Cucurbitaceae
<i>Diaphania indica</i>	Cucurbitaceae
<i>Dichomeris vacciniella</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Dioryctria zimmermani</i>	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga taxifolia</i>
<i>Duponchelia fovealis</i>	Polífaga de ornamentales y <i>Fragaria</i> spp.
<i>Dyspessa ulula</i>	<i>Allium</i> spp., <i>Arum</i> spp.
<i>Ecdytolopha aurantiana</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Macadamia</i> spp.
<i>Enarmonia formosana</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Endoclitia excrescens</i>	<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Diospyros kaki</i>
<i>Epichoristodes acerbella</i>	<i>Dianthus</i> spp., <i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Geranium</i> spp., <i>Gerbera</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Leucadendron</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
<i>Epiphyas postvittana</i>	Polífaga: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Actinidia</i> spp., <i>Adiantum</i> spp., <i>Amaranthus</i> spp., <i>Arctotis</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Azara serrata</i> , <i>Camellia</i> spp., <i>Campsis</i> spp., <i>Ceanothus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cordylone</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Drimys</i> spp., <i>Embothrium coccineum</i> var. <i>longifolium</i> , <i>Euonymus japonica</i> , <i>Fortunella</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Gerbera</i> spp., <i>Grevillea</i> spp., <i>Gypsophila elegans</i> , <i>G. paniculata</i> , <i>Hedera</i> spp., <i>Hypericum</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Laurus nobilis</i> , <i>Lavandula</i> spp., <i>Leptospermum scoparium</i> , <i>Ligustrum</i> spp., <i>Lonicera</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Olearia</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Phygelius</i> spp., <i>Pittosporum</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyracantha</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Skimmia</i> spp., <i>Troyer citrange</i> , <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vinca</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Eucosma gloriola</i>	<i>Pinus</i> spp.
<i>Eupoecilia ambiguella</i>	Rosaceae, <i>Ribes</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Euproctis</i> spp.	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Quercus</i> spp., frutales, (<i>Prunus</i> spp.), ornamentales
<i>Euzophera batangensis</i>	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Euzophera bigella</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Pyrus</i> spp.
<i>Euzophera semifumeralis</i>	<i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Garella musculana</i> (sin. <i>Erschoviella musculana</i>)	<i>Juglans regia</i> y <i>Juglans nigra</i>
<i>Gelechia</i> (= <i>Aroga</i>) <i>trialbamaculella</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Gelechia pistaciae</i>	<i>Pistacia</i> spp.
<i>Gracillaria</i> (= <i>Caloptilia</i>) <i>syringella</i>	<i>Fraxinus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Ligustrum</i> spp., <i>Syringa</i> spp.
<i>Grapholita</i> spp. (excepto <i>G. molesta</i>)	Rosaceae, <i>Quercus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Gypsonoma aceriana</i>	<i>Populus</i> spp.
<i>Hedya</i> spp.	<i>Corylus avellana</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Helicoverpa armigera</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Pelargonium</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>S. melongena</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Helicoverpa assulta</i>	<i>Capsicum annuum</i>
<i>Heliothis subflexa</i>	<i>Physalis</i> spp.
<i>Hylesia nigricans</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Populus</i> spp.
<i>Hyphantria cunea</i>	<i>Salicaceae</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Keiferia lycopersicella</i>	<i>Lycopersicon esculentum</i>
<i>Lampronia capitella</i>	<i>Ribes</i> spp.
<i>Lampronia corticella</i> (=L. rubiella)	<i>Rubus</i> spp.
<i>Leucinodes orbonalis</i>	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>S. tuberosum</i>
<i>Leucoma salicis</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Leucoptera malifoliella</i>	<i>Cotoneaster</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Sorbus</i> spp.
<i>Lozotaenia</i> (=Tortrix) <i>capensana</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Lymantria albescens</i> = <i>Lymantria postalba</i>	Fagaceae, Myrtaceae, <i>Livistona chinensis</i> y otros artículos reglamentados como naves y contenedores marítimos.
<i>Lymantria dispar</i>	<i>Latifolias</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Pistacia</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., y otros artículos reglamentados como naves y contenedores marítimos.
<i>Lymantria mathura</i>	Artículos reglamentados como naves y contenedores marítimos
<i>Lymantria monacha</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., y otros artículos reglamentados como naves y contenedores marítimos.
<i>Lymantria umbrosa</i>	Aceraceae, Betulaceae, Fagaceae, Moraceae, Pinaceae, Rosaceae, Salicaceae, Ulmaceae, y otros artículos reglamentados como naves y contenedores marítimos.
<i>Malacosoma</i> spp.	<i>Fagus sylvatica</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Salix</i> spp., frutales (<i>Prunus avium</i>), ornamentales
<i>Mamestra brassicae</i>	Brassicaceae, <i>Alstroemeria</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp., <i>Rudbeckia</i> spp.
<i>Marmara</i> spp.	<i>Citrus</i> spp., <i>Opuntia</i> spp., <i>Persea americana</i>
<i>Maroga melanostigma</i>	Polífago de frutales (<i>Corylus avellana</i>), ornamentales y forestales
<i>Melitara</i> (=Olycella) <i>nephelepasa</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Metapleura potosi</i>	<i>Opuntia</i> spp.
<i>Mocis latipes</i>	<i>Chrysopogon</i> (=Vetiveria) <i>zizanioides</i>
<i>Monochroa fragariae</i>	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Neoleucinodes elegantalis</i>	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum betaceum</i> S. <i>melongena</i> , S. <i>quitoense</i>
<i>Operophtera bruceata</i>	Polífago de frutales y forestales
<i>Operophtera brumata</i>	Polífago: <i>Acer</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Opogona sacchari</i>	Araceae, Arecaceae, Cactaceae, <i>Gymnocalycium</i> spp., <i>Parodia</i> (=Notocactus) spp., <i>Aechmea fasciata</i> , <i>Aloe arborescens</i> , <i>Archontophoenix</i> spp., <i>Areca</i> spp., <i>Bactris</i> spp., <i>Bambusa</i> spp., <i>Begonia</i> spp., <i>Bismarckia nobilis</i> , <i>Bougainvillea</i> spp., <i>Bromelia</i> spp., <i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Cycas</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Echinocactus</i> spp., <i>Echinopsis</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Ferocactus</i> spp., <i>Ficus</i> spp. (excepto <i>Ficus carica</i>), <i>Gloxinia</i> spp., <i>Guzmania</i> spp., <i>Hohenbergia</i> spp., <i>Hylocereus trigonus</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Nidularium</i> spp., <i>Pachira aquatica</i> , <i>Philodendron</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Strelitzia</i> spp., <i>Tillandsia</i> spp., <i>Vriesea</i> spp., <i>Washingtonia</i> spp., <i>Wodyetia bifurcata</i> , <i>Yuca</i> spp., <i>Zea mays</i> .
<i>Orgyia pseudotsugata</i>	Pinaceae
<i>Orgyia thyellina</i>	Fagaceae, <i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Morus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
<i>Ostrinia furnacalis</i>	Poaceae
<i>Ostrinia nubilalis</i>	<i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Pammene fasciana</i>	<i>Castanea</i> spp., <i>Fagus sylvatica</i>
<i>Pandemis cerasana</i>	Rosaceae
<i>Pandemis heparana</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Quercus</i> spp.
<i>Papilio demoleus</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Paranthrene</i> spp.	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Paysandisia archon</i>	Arecaceae
<i>Pennisetia</i> spp.	<i>Rubus</i> spp.
<i>Planotortrix</i> spp.	Rosaceae, <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia arguta</i> , <i>Cupressus</i> spp., <i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Platynota stultana</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Senecio</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Platyptilia carduidactyla</i>	<i>Cynara scolymus</i>
<i>Podosesia syringae</i>	<i>Chionanthus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Syringa</i> spp.
<i>Poecilocampa populi</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Salix</i> spp., ornamentales
<i>Polychrosis viteana</i> (Sin: <i>Paralobesia viteana</i>)	<i>Vitis</i> spp.
<i>Prays citri</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Prays endocarpa</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Prays oleae</i>	Oleaceae
<i>Prionoxystus robiniae</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus dulcis</i>
<i>Ptycholoma lecheana</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Recurvaria leucateila</i>	Rosaceae
<i>Recurvaria nanella</i>	Rosaceae, <i>Corylus avellana</i>
<i>Rhyacionia</i> spp. (exc. <i>R. buoliana</i>)	<i>Pinus</i> spp.
<i>Scrobipalpa ocellatella</i>	Chenopodiaceae (cultivos varios, ornamentales)
<i>Sesia</i> spp.	<i>Populus</i> spp.
<i>Sparganothis pilleriana</i>	Rosaceae (<i>Fragaria x ananassa</i>), <i>Camellia</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Spilonota macropetana</i> (Sin: <i>Strepsicrates macropetana</i>)	<i>Acacia</i> spp., <i>Casuarina</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Spilonota ocellana</i>	Rosaceae, <i>Corylus avellana</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Spodoptera littoralis</i>	Plaga polífaga de flores, frutales, y ornamentales
<i>Stenoma catenifer</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Synanthedon</i> spp.	<i>Acer</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Syricoris</i> (=Celypha) <i>lacunana</i> (Sin: <i>Olethreutes lacunana</i>)	<i>Fragaria</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
<i>Tecia solanivora</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Teia anartoides</i> (Sin: <i>Orgyia anartoides</i>)	Polífaga de frutales, forestales y ornamentales
<i>Thaumatotibia</i> (=Cryptophlebia) <i>leucotreta</i>	<i>Ananas</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Macadamia</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. persica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	<i>Cedrus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Thyrinteina</i> spp.	<i>Eucalyptus</i> spp., y otros artículos regulados
<i>Timocratica</i> spp.	<i>Populus</i> spp.
<i>Udea rubigalis</i>	<i>Ageratum houstonianum</i> , <i>Antirrhinum</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp.
<i>Xestia c-nigrum</i>	Polífaga de frutales, hortalizas
<i>Yponomeuta malinellus</i>	<i>Malus</i> spp.
<i>Yponomeuta padella</i> (Sin: <i>Y. padellus</i>)	<i>Crataegus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> y <i>Prunus spinosa</i>
<i>Zeuzera multistrigata</i>	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Zeuzera pyrina</i>	Polífaga de frutales, forestales y ornamentales
<i>Zophodia</i> spp. (incluye a <i>Cactoblastis cactorum</i>)	<i>Opuntia</i> spp.

ORTHOPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTES
<i>Oecanthus</i> spp.	Polífaga de frutales

THYSANOPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Chaetanaphothrips orchidii</i>	Polífaga de frutales y ornamentales
<i>Frankliniella intonsa</i>	Polífaga de frutales, forestales y ornamentales
<i>Frankliniella vaccinii</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Hercinothrips femoralis</i>	Polífaga de ornamentales
<i>Pezothrips kellyanus</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Scirtothrips aceri</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Scirtothrips aurantii</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Mangifera indica</i>
<i>Scirtothrips citri</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp. <i>Poncirus trifoliata</i> . <i>Troyer citrange</i> .
<i>Scirtothrips dorsalis</i>	<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Gardenia</i> spp., <i>Gerbera</i> spp., <i>Hedera</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Rhododendron</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>
<i>Scirtothrips perseae</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Selenothrips rubrocinctus</i>	Polífaga. <i>Orchidaceae</i> , <i>Areca</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Croton</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Heliconia</i> spp., <i>Jatropha curcas</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i>
<i>Sericothrips</i> (= <i>Neohydatothrips</i>) <i>opuntiae</i>	<i>Opuntia</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Photinia</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Thrips palmi</i>	<i>Cucurbitaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Orchidaceae</i> , <i>Solanaceae</i> , <i>Agapanthus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Gerbera</i> spp., <i>Stevia rebaudiana</i>

HONGOS Y CROMISTAS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Alternaria gaisen</i> (= <i>A. kikuchiana</i>)	<i>Pyrus pyrifolia</i>
<i>Alternaria helianthi</i>	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Alternaria porri</i>	<i>Allium</i> spp.
<i>Anisogramma</i> (= <i>Cryptosporella</i>) <i>anomala</i>	<i>Corylus</i> spp.
<i>Apiosporina morbosa</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Ascochyta lethalis</i>	<i>Melilotus</i> spp.
<i>Ascochyta rabiei</i>	<i>Cicer arietinum</i>
<i>Austropuccinia psidii</i> (= <i>Puccinia psidii</i>)	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Botryosphaeria corticis</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Bretziella fagacearum</i> (= <i>Ceratocystis fagacearum</i>)	<i>Castanea</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Cephalosporium diospyri</i>	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Ceratocystis coerulescens</i>	<i>Acer saccharum</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Ceratocystis fimbriata</i>	<i>Acacia decurrens</i> , <i>A. mangium</i> , <i>Actinidia</i> spp., <i>Cajanus cajan</i> , <i>Carya cordiformis</i> , <i>C. ovata</i> , <i>Cassia javanica</i> , <i>C. renigera</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea arabica</i> , <i>C. canephora</i> , <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Crotalaria juncea</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Erythrina</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Gmelina arborea</i> , <i>Herrania</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Metroxylon</i> spp., <i>Pimenta dioica</i> (= <i>P. officinalis</i>), <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Spathodea campanulata</i> , <i>Syngonium auritum</i> , <i>S. podophyllum</i>
<i>Ceratocystis paradoxa</i>	<i>Areca</i> spp., <i>Bismarckia nobilis</i> , <i>Brahea armata</i> , <i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chambeyronia macrocarpa</i> , <i>Chrysaliidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Livistona australis</i> , <i>Livistona chinensis</i> , <i>Hyophorbe</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Roystonea</i> spp., <i>Washingtonia</i> spp., <i>Wodyetia bifurcata</i>
<i>Cerotelium fici</i>	<i>Ficus</i> spp.
<i>Claviceps africana</i>	<i>Sorghum</i> spp.
<i>Cochliobolus victoriae</i>	<i>Avena sativa</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Festulolium</i> spp., <i>Lolium</i> spp., <i>Panicum italicum</i> (<i>Setaria italica</i>), <i>Paspalum notatum</i> , <i>Phalaris</i> spp. (excepto <i>P. brachystachis</i>), <i>Phleum pratense</i> , <i>Sorghum</i> spp.
<i>Colletotrichum acutatum sensu stricto</i>	<i>Anemone</i> spp., <i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Lupinus mutabilis</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> , <i>V. virgatum</i> (= <i>V. ashei</i>)
<i>Colletotrichum fragariae</i>	<i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Colletotrichum orbiculare</i> (= <i>C. lagenarium</i>)	<i>Cucurbitaceae</i> , <i>Benincasa hispida</i> , <i>Momordica charantia</i> , <i>Sechium edule</i>
<i>Colletotrichum truncatum</i> (= <i>Colletotrichum capsici</i>)	<i>Amaranthus</i> spp., <i>Cajanus cajan</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Jatropha curcas</i> , <i>Lotus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vicia</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
<i>Cronartium</i> spp. (= <i>Peridermium</i> spp.)	<i>Castanea</i> spp., <i>Gentiana</i> spp., <i>Nemesia</i> spp., <i>Paeonia</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Ribes</i> spp.
<i>Cryphonectria parasitica</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Cryptodiaportha populea</i>	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Cryptosphaeria ligniota</i> (=C. populina)	<i>Populus</i> spp.
<i>Cylindrosporium juglandis</i>	<i>Juglans cinerea</i> , <i>J. regia</i>
<i>Cytospora terebinthi</i>	<i>Pistacia</i> spp.
<i>Diaporthe</i> (=Phomopsis) <i>helianthi</i>	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Diaporthe cinerescens</i>	<i>Ficus</i> spp.
<i>Diaporthe eres</i> (=Phomopsis fukushii)	<i>Diospyros kaki</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus persica</i> (incluyendo <i>P. persica</i> var. <i>nucipersica</i>), <i>Pyrus communis</i> y <i>Pyrus pirifolia</i> .
<i>Didymella</i> (=Mycosphaerella) <i>ligulicola</i>	<i>Chrysanthemum</i> spp.
<i>Drepanopeziza populorum</i> (Sin: Marssonina populi)	<i>Populus</i> spp.
<i>Elsinöe australis</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
<i>Elsinöe fawcettii</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
<i>Endocronartium harknessii</i>	<i>Pinus</i> spp.
<i>Exobasidium oxycocci</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Exobasidium perenne</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Exobasidium rostrupii</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Exobasidium vaccinii</i>	<i>Camellia</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Fusicladium effusum</i>	<i>Carya</i> spp.
<i>Ganoderma lucidum</i>	Forestales (madera)
<i>Geosmithia morbida</i>	<i>Juglans</i> spp., <i>Pterocarya</i> spp.
<i>Gnomonia nerviseda</i>	<i>Carya</i> spp.
<i>Gremmeniella abietina</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Grosmannia</i> (=Ophiostoma) <i>wagenieri</i>	<i>Pinus contorta</i> , <i>P. ponderosa</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Tsuga</i> spp.
<i>Guignardia bidwellii</i>	<i>Ampelopsis</i> spp., <i>Asplenium Parthenocissus</i> spp., <i>Vitis</i> spp. <i>nidus</i> ,
<i>Guignardia citricarpa</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>trifoliata Poncirus</i>
<i>Gymnoconia peckiana</i> (=Arthuriomyces peckianus, <i>Gymnoconia nitens</i>)	<i>Rubus fruticosus</i> , <i>R. occidentalis</i>
<i>Gymnosporangium</i> spp.	<i>Rosaceae</i> ornamentales, <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Cupressus</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Juniperus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Photinia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>R. occidentalis</i>
<i>Heterobasidium annosum</i>	Coniferales, Latifoliadas
<i>Kuehneola uredinis</i>	<i>Rubus</i> spp.
<i>Lecanosticta acicola</i> (=Scirrhia acicola)	<i>Pinus</i> spp.
<i>Melanconis juglandis</i>	<i>Juglans nigra</i> , <i>J. regia</i>
<i>Microsphaera grossulariae</i>	<i>Ribes nigrum</i> , <i>R. rubrum</i> , <i>R. uvacrispa</i>
<i>Monilinia fructigena</i>	<i>Rosaceae</i> ornamentales, <i>Corylus</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp.
<i>Monilinia oxycocci</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Monilinia polystroma</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. y <i>Cydonia</i> spp.
<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Mycosphaerella caryigena</i>	<i>Carya</i> spp.
<i>Mycosphaerella nigromaculans</i>	<i>Vaccinium</i> spp.
<i>Naohidemycetes vaccinii</i> (=Pucciniastrum vaccinii)	<i>Rhododendron</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Neofabraea malicorticis</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Neofabraea perennans</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
<i>Neopestalotiopsis rosae</i>	<i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Ophiognomonina clavigena</i>	<i>Juglans cinerea</i> , <i>Juglans nigra</i> , <i>Juglans ailantifolia</i> var. <i>cordiformis</i>
<i>Ophiostoma</i> (=Ceratocystis) <i>ulmi</i>	<i>Ulmus</i> spp., <i>Zelkova carpinifolia</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> (= <i>Ceratocystis ulmi</i> sensu auct.)	<i>Ulmus</i> spp., <i>Zelkova carpinifolia</i>
<i>Passalora</i> (= <i>Cercospora</i>) <i>sequoiae</i>	Coniferales
<i>Peronophythora litchii</i>	<i>Litchi chinensis</i>
<i>Peronospora fragariae</i>	<i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i> (= <i>P. tabacina</i>)	<i>Nicotiana tabacum</i>
<i>Phakopsora cherimoliae</i>	<i>Annona</i> spp.
<i>Phellinus weirii</i>	Coniferales
<i>Phialophora cinerescens</i>	<i>Dianthus</i> spp.
<i>Phoma</i> (= <i>Deuterophoma</i>) <i>tracheiphila</i>	<i>Citrus</i> spp. e híbridos, <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
<i>Phoma apicola</i>	<i>Apium graveolens</i> , <i>A. graveolens</i> var. <i>rapaceum</i> , <i>Coriandrum sativum</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
<i>Phomopsis asparagi</i>	<i>Asparagus officinalis</i> , <i>A. virgatus</i>
<i>Phomopsis juniperivora</i>	Coniferales
<i>Phragmidium arcticum</i>	<i>Rubus arcticus</i>
<i>Phragmidium rubi-idaei</i>	<i>Rubus idaeus</i> , <i>R. occidentalis</i>
<i>Phyllosticta solitaria arbutifolia</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	Polífaga
<i>Physopella</i> (= <i>Phakopsora</i>) <i>ampelopsidis</i>	<i>Vitis</i> spp.
<i>Phytophthora infestans</i> tipo aparamiento A2	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Phytophthora niederhauserii</i>	<i>Prunus dulcis</i> y <i>Hedera helix</i>
<i>Phytophthora palmivora</i>	<i>Actinidia arguta</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Anthurium</i> spp., <i>Archontophoenix</i> spp., <i>Areca</i> spp., <i>Arenga</i> spp., <i>Attalea</i> spp., <i>Bactris</i> spp., <i>Brassalova</i> spp., <i>Butia</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Caryota</i> spp., <i>Cattleya</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Dendrobium</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Hedera</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Oncidium</i> spp., <i>Pachira aquatica</i> , <i>Phalaenopsis</i> spp., <i>Philodendron</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Roystonea</i> spp., <i>Syagrus</i> spp., <i>Washingtonia</i> spp.
<i>Phytophthora porri</i>	<i>Allium</i> spp.
<i>Phytophthora ramorum</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Aesculus californica</i> , <i>Arbutus menziesii</i> , <i>Arctostaphylos</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Drimys winteri</i> , <i>Eucalyptus haemastoma</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Heteromeles arbutifolia</i> , <i>Ilex aquifolium</i> , <i>I. purpurea</i> , <i>Larix</i> spp., <i>Lithocarpus glaber</i> , <i>Lonicera hispidula</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Notholithocarpus</i> (= <i>Lithocarpus</i>) <i>densiflorus</i> , <i>Osmanthus</i> spp., <i>Picea sitchensis</i> , <i>Pieris</i> spp., <i>Prunus laurocerasus</i> , <i>P. lusitanica</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Rhamnus</i> (= <i>Frangula</i>) <i>californica</i> , <i>Rhododendron</i> spp. (excepto <i>Rhododendron simsii</i>), <i>Salix caprea</i> , <i>Sequoia sempervirens</i> , <i>Umbellularia californica</i> , <i>Vaccinium</i> spp., <i>Viburnum</i> spp.
<i>Phytophthora x cambivora</i> .	<i>Castanea crenata</i> , <i>C. sativa</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Quercus ilex</i>
<i>Pseudocercospora pinidensiflorae</i> (= <i>Cercoseptoria pinidenstiflorae</i>)	<i>Pinus</i> spp.
<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>	<i>Cissus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
<i>Puccinia asparagi</i>	<i>Asparagus officinalis</i>
<i>Puccinia caricina</i>	<i>Ribes rubrum</i> , <i>R. uva-crispa</i>
<i>Puccinia pittieriana</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Puccinia ribis</i>	<i>Ribes nigrum</i> , <i>R. rubrum</i>
<i>Pucciniastrum goeppertianum</i>	<i>Vaccinium</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Pyrenophora bromi</i>	<i>Bromus hordeaceus</i> (= <i>B. mollis</i>)
<i>Quambalaria eucalypti</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Raffaelea lauricola</i>	<i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Sassafras albidum</i>
<i>Rhabdocline pseudotsugae</i>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Rhabdocline weirii</i>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Rhizoctonia tuliparum</i>	<i>Iris</i> spp. y <i>Tulipa</i> spp.
<i>Septoria pistaciae</i>	<i>Pistacia</i> spp.
<i>Septoria pistaciarum</i>	<i>Pistacia</i> spp.
<i>Septoria pistacina</i>	<i>Pistacia</i> spp.
<i>Strococcus conigenus strobilinus</i> (= <i>S.</i>)	Coniferales
<i>Sphaceloma perseae</i>	<i>Persea americana</i>
<i>Stegophora ulmea</i>	<i>Ulmus</i> spp., <i>Zelkova serrata</i>
<i>Stenocarpella macrospora</i>	<i>Zea mays</i>
<i>Stenocarpella maydis</i>	<i>Zea mays</i>
<i>Synchytrium endobioticum</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Teratosphaeria</i> (= <i>Mycosphaerella</i>) <i>nubilosa</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Tilletia indica</i>	<i>Triticum</i> spp., <i>Triticale</i> spp.
<i>Urocystis occulta</i>	<i>Secale cereale</i>
<i>Uromyces terebinthi</i>	<i>Pistacia</i> spp.
<i>Ustilago crameri</i>	<i>Panicum maximum</i> , <i>P. miliaceum</i> , <i>Setaria italica</i>
<i>Ustilago violacea</i>	<i>Dianthus</i> spp.

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Anguina agrostis</i>	<i>Agrostis</i> spp., <i>Dactylis</i> spp., <i>Festuca</i> spp., <i>Festulolium</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Lolium</i> spp., <i>Phalaris</i> spp., <i>Phleum</i> spp., <i>Poa</i> spp.
<i>Anguina finesta</i>	<i>Lolium rigidum</i>
<i>Anguina graminis</i>	<i>Agrostis capillaris</i> (=A. <i>tenuis</i>), <i>A. stolonifera</i> , <i>Deschampsia flexuosa</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>F. rubra</i>
<i>Anguina tritici</i>	<i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp.
<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Orchidaceae, <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Vanda</i> spp. y otras ornamentales; <i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>P. miliaceum</i> , <i>Setaria italica</i>
<i>Bursaphelenchus</i> (= <i>Rhadinaphelenchus</i>) <i>cocophilus</i>	<i>Cocos</i> spp., <i>Phoenix</i> spp.
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Cedrus</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.,
<i>Cactodera cacti</i>	Cactaceae, Euphorbiaceae
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (excepto poblaciones chilenas)	<i>Agapanthus</i> spp., <i>Alopecurus</i> spp., <i>Amaryllis</i> spp., <i>Anemone</i> spp., <i>Apium graveolens</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Begonia</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> , <i>Bouvardia</i> spp., <i>Brassica napus</i> , <i>B. nigra</i> , <i>B. oleracea</i> , <i>B. rapa</i> , <i>Calathea lindbergii</i> , <i>Camassia</i> spp., <i>Campanula</i> spp., <i>Carex</i> spp., <i>Chionodoxa</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Colchicum</i> spp., <i>Convolvulus cneorum</i> , <i>Crocus</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Dahlia</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Dianthus</i> spp., <i>Disa</i> spp., <i>Eremurus</i> spp., <i>Eucomis</i> spp., <i>Festuca</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Freesia</i> spp., <i>Galanthus</i> spp., <i>Galeopsis</i> spp., <i>Galtonia</i> spp., <i>Geranium</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Gypsophila</i> spp., <i>Helianthemum</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Hymenocallis</i> spp., <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Iris</i> spp.,

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
	<i>Ismene</i> spp., <i>Ixia</i> spp., <i>Kniphofia</i> spp., <i>Lathyrus odoratus</i> , <i>L. sativus</i> , <i>Lavandula</i> spp., <i>Liatris</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycoris</i> spp., <i>Lysimachia clethroides</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Muscari</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Nerine</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Oenothera</i> spp., <i>Ornithogalum</i> spp., <i>Paeonia</i> spp., <i>Panicum maximum</i> , <i>P. miliaceum</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Phlox</i> spp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Poa</i> spp., <i>Polianthes tuberosa</i> , <i>Primula</i> spp., <i>Puschkinia</i> spp., <i>Ranunculus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Scilla</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Setaria italica</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Sprekelia</i> spp., <i>Strelitzia</i> spp., <i>Taraxacum kok-saghyz</i> , <i>T. officinale</i> , <i>Tigridia</i> spp., <i>Triticum aestivum</i> , <i>Tulipa</i> spp., <i>Viola</i> spp., <i>Zantedeschia</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Zephyranthes robusta</i> (= <i>Habranthus robustus</i>)
<i>Ditylenchus gigas</i> (= <i>Ditylenchus dipsaci</i> , raza gigante del haba)	<i>Vicia</i> spp.
<i>Helicotylenchus multicinctus</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> y otras ornamentales
<i>Heterodera avenae</i>	<i>Avena sativa</i> , <i>Triticum aestivum</i>
<i>Heterodera fici</i>	<i>Ficus</i> spp.
<i>Heterodera glycines</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i>
<i>Heterodera mediterranea</i>	<i>Pistacia lentiscus</i> , <i>P. vera</i> , <i>Olea europaea</i>
<i>Heterodera zeae</i>	<i>Bambusa</i> spp., <i>Zea mays</i>
<i>Longidorus attenuatus</i>	<i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Longidorus caespiticola</i>	<i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasus</i>
<i>Longidorus elongatus</i>	<i>Acer</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Mentha piperita</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Ribes uvacrispa</i> , <i>R. rubrum</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>R. idaeus</i> , <i>Rubus occidentalis</i>
<i>Longidorus macrosoma</i>	<i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Mentha</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Ribes rubrum</i> , <i>R. uvacrispa</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Rubus occidentalis</i>
<i>Meloidogyne enterolobii</i>	Polífaga cultivo, frutales y ornamentales
<i>Meloidogyne hispanica</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Prunus</i> spp.
<i>Paralongidorus maximus</i>	<i>Corylus avellana</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Prunus domestica</i>
<i>Pratylenchus coffeae</i>	<i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Anthurium</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Chrysopogon</i> (= <i>Vetiveria zizanioides</i>), <i>Citrus</i> spp., <i>Codiaeum</i> spp., <i>Cordyline</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Peperomia</i> spp., <i>Philodendron</i> spp., <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Tagetes</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Zingiber officinale</i>
<i>Pratylenchus fallax</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Prunus davidiana</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp. y otros ornamentales
<i>Pratylenchus zeae</i>	<i>Acca</i> (= <i>Feijoa sellowiana</i>), <i>Aster</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Psidium guajava</i>
<i>Radopholus similis sensu lato</i>	<i>Acanthus mollis</i> , <i>Aechmea fasciata</i> , <i>Ageratum houstonianum</i> , <i>Allamanda</i> spp., <i>Aloe</i> spp., <i>Anthurium</i> spp., <i>Bambusa</i> spp., <i>Calathea</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Erica</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp.,

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
	<i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Gardenia</i> spp., <i>Geranium</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Ixora</i> spp., <i>Jacaranda</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Peperomia</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Philodendron</i> spp., <i>Pilea</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Strelitzia</i> spp., <i>Syagrus</i> spp., <i>Syngonium</i> spp., <i>Zingiber officinale</i>
<i>Rotylenchulus macrodoratus</i>	<i>Olea europaea</i> , <i>Pistacea vera</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitis vinifera</i>
<i>Rotylenchulus reniformis</i>	<i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Dracaena</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Hemerocallis</i> spp., <i>Hylocereus costaricensis</i> , <i>Hylocereus undatus</i> , <i>Impatiens</i> spp., <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Jasminum</i> spp., <i>Kalanchoe</i> spp., <i>Litchi chinensis</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Zingiber officinale</i>
<i>Scutellonema brachyurus</i>	<i>Aloe</i> spp., <i>Anthurium</i> spp., <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Begonia</i> spp., <i>Calathea</i> spp., <i>Camellia</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Clivia</i> spp., <i>Dianthus</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Echinocactus</i> spp., <i>Echinopsis</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>E. trigona</i> , <i>Ferocactus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Fuchsia</i> spp., <i>Gardenia</i> spp., <i>Gymnocalcium</i> spp., <i>Hemerocallis</i> spp., <i>Hylocereus trigonus</i> , <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ilex</i> spp., <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Parodia</i> (= <i>Notocactus</i>) spp., <i>Peperomia</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Strelitzia</i> spp., <i>Yucca</i> spp.
<i>Xiphinema americanum</i> “sensu lato” (excepto poblaciones chilenas)	Polífaga
<i>Xiphinema americanum stricto</i> “sensu	<i>Acer palmatum</i> , <i>Castanea</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Juglans hindsii</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Mentha piperita</i> , <i>Pistacea</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. avium</i> , <i>P. avium</i> x <i>P. canescens</i> x <i>P. tomentosa</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. cerasus</i> x <i>P. kursai</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. mahaleb</i> , <i>P. persica</i> , <i>P. persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>P. salicina</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Vaccinium</i> spp.
<i>Xiphinema bakeri</i>	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Xiphinema brevicolle</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>Nucipersica</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Rosa</i> spp.
<i>Xiphinema coxi</i>	<i>Prunus avium</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	<i>Astilbe</i> spp., <i>Dianthus</i> spp., <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Impatiens</i> spp., <i>Malus</i> spp. e híbridos, <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>P. avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. mahaleb</i> , <i>P. persica</i> , <i>P. persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>P. salicina</i> , <i>P. serrulata</i> , <i>P. tomentosa</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Ribes rubrum</i> , <i>R. iva-crispa</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus idaeus</i>
<i>Xiphinema italiae</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i>

MOLUSCOS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Bradybaena similaris</i>	Polífaga y otros artículos reglamentados como contenedores
<i>Cathaica fasciola</i>	Polífaga y de otros artículos reglamentados no vegetales

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Cernuella neglecta</i>	<i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum</i> spp.
<i>Cernuella virgata</i>	<i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum</i> spp.
<i>Cochlicella acuta</i>	<i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum</i> spp.
<i>Eobania vermiculata</i>	Polífaga y otros artículos reglamentados como contenedores
<i>Lissachatina fulica</i> (= <i>Achatina fulica</i>)	Polífaga: cultivos, frutales, hortalizas, ornamentales, y otros artículos reglamentados.
<i>Monacha cartusiana</i>	Polífaga y otros artículos reglamentados como contenedores
<i>Sarasinula plebeia</i>	Polífaga y otros artículos reglamentados como contenedores
<i>Succinea</i> spp. (excepto <i>S. chiloensis</i> , <i>S. cryptica</i> , <i>S. cumingi</i> , <i>S. donneti</i> , <i>S. fernandi</i> , <i>S. fragilis</i> , <i>S. labiosa</i> , <i>S. magellanica</i> , <i>S. mamillata</i> , <i>S. masafuerae</i> , <i>S. meridionalis</i> , <i>S. pinguis</i> , <i>S. rubicunda</i> , <i>S. semiglobosa</i> y <i>S. texta</i>).	Polífaga: ornamentales, frutales y otros artículos reglamentados.
<i>Theba pisana</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Triticum</i> spp.

BACTERIAS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Acidovorax citrulli</i>	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>C. pepo</i>
<i>Brenneria rubrifaciens</i> (= <i>Erwinia rubrifaciens</i>)	<i>Juglans hindsii</i> , <i>J. regia</i>
<i>Brenneria salicis</i> (= <i>Erwinia salicis</i>)	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
' <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> ', ' <i>Ca. Liberibacter americanus</i> ', ' <i>Ca. Liberibacter asiaticus</i> ' (<i>Huanglongbing</i>)	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> e híbridos, y otras especies de la familia Rutaceae
' <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> ' (' <i>Candidatus Liberibacter psyllaurosus</i> ')	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Clavibacter insidiosus</i>	<i>Lotus</i> spp., <i>Medicago polymorpha</i> , <i>M. sativa</i> , <i>M. truncatula</i> , <i>Melilotus</i> spp., <i>Trifolium</i> spp.
<i>Clavibacter nebraskensis</i>	<i>Zea mays</i>
<i>Clavibacter sepedonicus</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Lablab purpureus</i> , <i>Phaseolus coccineus</i> , <i>P. lunatus</i> , <i>P. vulgaris</i> , <i>Vigna</i> spp.
<i>Dickeya</i> spp. (= <i>Erwinia chrysanthemi</i>) (excepto <i>D. dianthicola</i> y <i>D. zeae</i>)	Polífaga ornamentales, <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
<i>Erwinia amylovora</i>	Rosaceae ornamentales, <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Fragaria x ananassa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Photinia</i> spp., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Rubus</i> spp.
<i>Erwinia pyrifoliae</i>	<i>Pyrus pyrifolia</i>
<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	<i>Zea mays</i>
<i>Pseudomonas avellanae</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i>	<i>Chionanthus</i> spp., <i>Dipladenia sanderi</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Olea europaea</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> excepto biovar 3	<i>Actinidia</i> spp., <i>Paulownia tomentosa</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	<i>Cucumis melo</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>C. pepo</i> var. <i>medullosa</i> , <i>Strelitzia</i> spp.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i>	<i>Prunus cerasifera</i> , <i>P. persica</i> , <i>P. persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>P. salicina</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i>	<i>Lablab purpureus</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia</i> spp.
<i>Ralstonia solanacearum</i> raza 1	Polífaga (Solanaceae, Fabaceae y otros)

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Troyer citrange</i>
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (= <i>X. campestris</i> pv. <i>dieffenbachiae</i>)	<i>Aglaonema</i> spp., <i>Anthurium</i> spp., <i>Caladium</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Philodendron</i> spp., <i>Synгонium</i> spp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>punicae</i>	<i>Punica granatum</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i>	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>C. metuliferus</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita ficifolia</i> , <i>C. foetidissima</i> , <i>C. maxima</i> , <i>C. moschata</i> , <i>C. pepo</i> , <i>C. pepo</i> var. <i>medullosa</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i>	<i>Ficus</i> spp.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i> pv.	<i>Hyacinthus</i> spp., <i>Scilla</i> spp.
<i>Xanthomonas fragariae</i>	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (= <i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>)	<i>Coriandrum sativum</i> , <i>Daucus carota</i>
<i>Xanthomonas populi</i> (= <i>Aplanobacter populi</i>)	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i>	<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum aestivum</i> y <i>Triticum spelta</i>
<i>Xylella fastidiosa</i>	Polífaga hortalizas, frutales y ornamentales, <i>Acer</i> spp., <i>Liquidambar styraciflua</i> , <i>Pinus taeda</i> y <i>Salix</i> spp., <i>Sambucus nigra</i>

FITOPLASMAS Y SPIROPLASMAS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
Blueberry stunt phytoplasma	<i>Vaccinium</i> spp.
Buckland valley grapevine yellows phytoplasma	<i>Vitis</i> spp.
' <i>Candidatus</i> P. pruni' (Peach X disease)	<i>Prunus</i> spp.
' <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum'	<i>Solanum tuberosum</i>
' <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense'	<i>Cordyline</i> spp., <i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Vitis</i> spp.,
' <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali'	<i>Corylus avellana</i> , <i>Lilium</i> spp., <i>Malus</i> spp.
' <i>Candidatus</i> prunorum' Phytoplasma	<i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus</i> spp.
' <i>Candida</i> phoenicium' <i>tus</i> Phytoplasma	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus dulcis</i> y <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>
' <i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi'	<i>Rubus</i> spp.,
Grapevine flavescence dorée phytoplasma	<i>Vitis</i> spp.
Palm lethal yellowing phytoplasmas	<i>Arenga</i> spp., <i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Hedera</i> spp., <i>Hyophorbe</i> spp., <i>Livistona australis</i> , <i>L. chinensis</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Pritchardia</i> spp., <i>Trachycarpus</i> spp.
Peach yellows phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
<i>Spiroplasma citri</i>	<i>Armoracia rusticana</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Troyer citrange</i> , <i>Vinca</i> spp.
Tomato big bud phytoplasma (Australia)	<i>Vitis</i> spp.

VIRUS Y VIROIDES

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Avocado sunblotch viroid</i> , ASBVd (= <i>Avsunviroid albamaculaperseae</i>)	<i>Persea americana</i>
<i>Barley stripe mosaic virus</i> , BSMV (= <i>Hordeivirus hordei</i>)	<i>Avena</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>T. durum</i> , <i>Secale cereale</i> x <i>T. aestivum</i> , <i>Triticum spelta</i> , <i>Bromus mollis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Festulolium</i> spp., <i>Lolium</i> spp., <i>Panicum maximum</i> , <i>P. miliaceum</i> , <i>Setaria italica</i>

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
Beet curly top virus, BCTV (= Curtovirus betae)	Cucurbitaceae, <i>Beta vulgaris</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
Blueberry leaf mottle virus, (= Nepovirus myrtilli)	<i>Vaccinium</i> spp.
Blueberry scorch virus, BISCV (=Carlavirus vaccinii)	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Vaccinium</i> spp.
Blueberry shock virus, BISHV (=Ilarvirus BSV)	<i>Vaccinium</i> spp.
Broad bean wilt virus, BBWV (=Fabavirus alphaviciae)	<i>Alstroemeria</i> spp., <i>Begonia</i> spp., <i>Cynara scolymus</i> , <i>Eutrema japonicum</i> , <i>Iris</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Ranunculus</i> spp., <i>Wasabia japonica</i>
Capsicum chlorosis virus, CaCV (=Orthotospovirus capsiciflavi)	<i>Ananas comosus</i> , <i>Amaranthus tricolor</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Hippeastrum hybridum</i> , <i>Tagetes minuta</i> , <i>Zantedeschia</i> spp.
Carnation ringspot virus, CRSV (=Dianthovirus dianthi)	<i>Dianthus</i> spp.
Cherry leaf roll virus, CLRV (=Nepovirus avii)	<i>Actinidia</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Juglans microcarpa</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasifera</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. serotina</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Sambucus nigra</i>
Cherry rasp leaf virus, CRLV (=Cheravirus avii)	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. mahaleb</i> , <i>P. persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Sambucus nigra</i>
Chrysanthemum stem necrosis virus, CSNV (=Orthotospovirus chrysanthinecrocaulis)	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i>
Citrus yellow vein clearing virus, CYVCV (=Potexvirus citriflaviviridae)	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
Coconut cadang-cadang viroid, CCCVd (=Cocadviroid cadangi)	<i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Hyophorbe</i> spp., <i>Roystonea</i> spp.
Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV (=Tobamovirus viridimaculae)	Cucurbitaceae: <i>Benincasa hispida</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis anguria</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Lagenaria siceraria</i> , <i>Luffa acutangula</i> , <i>Luffa aegyptiaca</i> (=L. <i>cylindrica</i>), <i>Momordica charantia</i> , <i>Trichosanthes cucumerina</i>
Cymbidium mosaic virus, CymMV (=Potexvirus cymbidii)	Orchidaceae
Grapevine red blotch virus, GRBV (=Grabovirus vitis)	<i>Vitis</i> spp.
Grapevine vein clearing virus, GVCG (=Badnavirus venavitis)	<i>Vitis</i> spp.
Kyuri green mottle mosaic virus, KGMMV (=Tobamovirus kyuri)	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita pepo</i>
Little cherry virus 2, LChV-2 (=Ampelovirus nanoavii)	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus serrulata</i>
Peach rosette mosaic virus, PRMV (=Nepovirus persicae)	<i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
Odontoglossum ringspot virus, ORSV (=Tobamovirus odontoglossi)	Orchidaceae
Peach mosaic virus, PcMV (=Trichovirus persicae)	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus besseyi</i> , <i>P. davidiana</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>P. salicina</i> , <i>Prunus serrulata</i> (Sin: <i>Prunus lannesiana</i>), <i>P. tormentosa</i> .
Pepper chat fruit viroid, PCFVd (=Pospiviroid parvicapsici)	<i>Solanum Lycopersicum</i> , <i>Capsicum annum</i>
Plum pox virus, PPV (excepto raza D) (=Potyvirus plumpoxi)	<i>Prunus</i> spp.
Potato spindle tuber viroid, PSTVd (=Pospiviroid fusituberis) (Tomato bunchy top viroid)	<i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Solanum tuberosum</i>

Potato yellow vein virus, PVYV (=Crinivirus flaviorolani)	<i>Solanum tuberosum</i>
Raspberry leaf curl virus, RLCV	<i>Rubus</i> spp.
Raspberry ringspot virus, RpRSV (=Nepovirus rubi)	<i>Anemone</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
Tobacco necrosis virus, TNV	<i>Anemone</i> spp., <i>Begonia</i> spp., <i>Cucumis sativus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Humulus lupulus</i> , <i>Lilium</i> spp., <i>Primula</i> spp., <i>Ranunculus</i> spp., <i>Sambucus nigra</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
Tomato apical stunt viroid, TASVd (=Pospiviroid apicimipeditum)	<i>Lycopersicum esculentum</i> y sus híbridos; ornamentales: <i>Brugmansia</i> spp., <i>Cestrum</i> spp., <i>Solanum jasminoides</i> , <i>S. rantonnetii</i> y <i>Streptosolen jamesonii</i>
Tomato black ring virus, TBRV (=Nepovirus nigranuli)	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i> , <i>Cynara scolymus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Sambucus nigra</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV(=Tobamovirus fructirugosum)	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> .
Tomato bushy stunt virus, TBSV (=Tombusvirus lycopersici)	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Tulipa</i> spp.
Tomato chlorosis virus, ToCV (=Crinivirus tomatichlorosis)	<i>Solanum tuberosum</i>
Tomato chlorotic dwarf viroid, TCDVd (=Pospiviroid chloronani)	<i>Lycopersicon esculentum</i> y sus híbridos; <i>Petunia</i> spp., <i>Vinca minor</i> , <i>Brugmansia sanguinea</i> , <i>Pittosporum tobira</i> , <i>Verbena</i> spp.
Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV (=Begomovirus solanumdelhiense)	Cucurbitaceae; Solanaceae
Tomato mottle mosaic virus, ToMMV (=Tobamovirus maculatusellati)	<i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Capsicum annuum</i> y <i>C. frutescens</i> ,
Turnip yellow mosaic virus, TYMV (=Tymovirus brassicae)	<i>Brassica oleracea</i>
Zucchini green mottle mosaic virus, ZGMMV (=Tobamovirus cucurbitae)	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Lagenaria siceraria</i>

MALEZAS

NOMBRE PLAGA
<i>Achyranthes aspera</i>
<i>Aegilops cylindrica</i>
<i>Alhagi maurorum</i>
<i>Amaranthus blitoides</i>
<i>Amaranthus palmeri</i>
<i>Ambrosia trifida</i> L. (Sin= <i>Ambrosia aptera</i> DC)
<i>Bassia scoparia</i>
<i>Brachiaria purpurascens</i> (=B. <i>mutica</i> , <i>Urochloa mutica</i>)
<i>Cabomba caroliniana</i>
<i>Centaurea diffusa</i>
<i>Chenopodium polyspermum</i> (=Lipandra <i>polysperma</i>)
<i>Chondrilla juncea</i>
<i>Cyclachaena xanthiifolia</i> (=Iva <i>xanthiifolia</i>)
<i>Euphorbia esula</i>
<i>Emex australis</i>
<i>Eragrostis plana</i>
<i>Helianthus ciliaris</i>
<i>Heliotropium europaeum</i>
<i>Heterotheca subaxillaris</i>

NOMBRE PLAGA
<i>Hydrilla verticillata</i>
<i>Hygrophila polysperma</i>
<i>Linaria dalmatica</i>
<i>Ludwigia grandiflora</i>
<i>Ludwigia repens</i>
<i>Lycium ferocissimum</i>
<i>Persicaria nepalensis</i>
<i>Pueraria triloba</i> (=P. <i>montana</i> var. <i>lobata</i>)
<i>Rhaphonticum repens</i> (=Acroptilon <i>repens</i> , <i>Centaurea repens</i>)
<i>Rotala rotundifolia</i>
<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (= R. <i>exaltata</i>)
<i>Salsola vermiculata</i> (=Nitrosalsola <i>vermiculata</i>)
<i>Senecio bonariensis</i>
<i>Senecio jacobaea</i> (=Jacobaea <i>vulgaris</i>)
<i>Senecio pampeanus</i>
<i>Senecio tweedii</i>
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>
<i>Sinapis arvensis</i> (=Brassica <i>kaber</i>)
<i>Solanum carolinense</i>
<i>Solanum viarum</i>
<i>Themeda quadrivalvis</i>
<i>Urochloa panicoides</i>

PLANTAS PARÁSITAS

NOMBRE PLAGA
<i>Arceuthobium</i> spp.
<i>Cuscuta</i> spp. (Excepto: <i>C. andina</i> , <i>C. campestris</i> , <i>C. chilensis</i> , <i>C. epithymum</i> , <i>C. micrantha</i> , <i>C. microstyla</i> , <i>C. odorata</i> , <i>C. pauciflora</i> , <i>C. pentagona</i> , <i>C. purpurata</i> , <i>C. pusilla</i> , <i>C. suaveolens</i> , <i>C. rustica</i> , <i>C. werdermanni</i>).
<i>Orobancha</i> spp. (excepto <i>O. minor</i> y <i>O. ramosa</i> (<i>Phelipanche ramosa</i>))
<i>Striga</i> spp.

Artículo Vigésimo Primero: Para conocer la distribución de plagas presentes en parte del territorio nacional y sometido a control oficial de contención, supresión o erradicación refiérase a las resoluciones generales y específicas de cada uno de los controles oficiales vigentes, las que se encuentran en la página WEB del SAG <https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/plagas-cuarentenarias-presentesbajocontrol-oficial> y <https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/plagas-cuarentenarias-presentes>.

La lista que a continuación se señala considera plagas presentes en parte del territorio nacional y sometido a control oficial de contención, supresión o erradicación:

ÁCAROS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Aceria hibisci</i>	<i>Hibiscus</i> spp.
<i>Brevipalpus phoenicis</i>	<i>Alpinia purpurata</i> , <i>Anthurium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Dipladenia sanderi</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Jathropa curcas</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Pachira aquatica</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
<i>Eutetranychus banksi</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Hibiscus rosasinensis</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Pachira aquatica</i> , <i>Prunus</i> spp.

INSECTOS
COLEOPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Diabrotica viridula</i>	<i>Zea mays</i>
<i>Hylotrupes bajulus</i>	Coniferales (madera y embalajes)
NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Pissodes castaneus</i>	<i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Taxus</i> spp.
<i>Sternochetus mangiferae</i>	<i>Mangifera indica</i>
<i>Trachymela sloanei</i>	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Corymbia</i> spp.

HEMIPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Aspidiotus destructor</i>	<i>Annona cherimola</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Musa x paradisiaca</i> , <i>Phoenix</i> spp., <i>Ziziphus jujuba</i>
<i>Dactylopius coccus</i> (*)	<i>Opuntia ficus-indica</i>
<i>Dysmicoccus brevipes</i>	<i>Ananas comosus</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Hylocereus undatus</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Musa</i> spp.
<i>Halyomorpha halys</i>	Polífago de frutales, cultivos y ornamentales; y otros artículos reglamentados
<i>Homalodisca vitripennis coagulata</i> (=H.	Polífaga (<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> y otros)
<i>Parlatoria oleae</i>	Polífaga de ornamentales, frutales, y <i>Schinus molle</i>
<i>Pseudococcus elisae</i>	<i>Psidium guajava</i> , <i>Musa</i> spp.
(*) : Bajo producción regulada de carmin.	

HYMENOPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Leptocybe invasa</i>	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Corymbia</i> spp. y sus híbridos.

LEPIDOPTERA

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Lobesia botrana</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Phyllocnistis citrella</i>	<i>Citrus</i> spp.

Resolución
7787 EXENT
A,
AGRICULTURA
N°1 1.2
D.O. 14.10.
2025

HONGOS Y CROMISTAS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Fusarium circinatum</i>	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
<i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Thecaphora solani</i> (= <i>Angiosorus solani</i>)	<i>Solanum tuberosum</i>

NEMATODOS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Globodera pallida</i>	<i>Solanum tuberosum</i>
<i>Globodera rostochiensis</i>	<i>Solanum tuberosum</i>

BACTERIAS

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Ralstonia solanacearum</i> Filotipo II-B	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Dahlia</i> spp. <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>

VIRUS Y VIROIDES

NOMBRE PLAGA	HOSPEDANTE
<i>Plum pox virus</i> raza D (<i>Potyvirus plumipoxi</i>)	<i>Prunus</i> spp.

Artículo Vigésimo Segundo: Las faltas a la presente Resolución serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley 1.764 y su Reglamento del Ministerio de Agricultura y Decreto Ley 3.557 de Protección Agrícola.

Artículo Vigésimo Tercero: La presente Resolución estará vigente el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Pablo Willson A., Director Nacional (S.).